

Разработано ООО «БИОЛИТ»

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОДУКЦИИ ООО «БИОЛИТ»**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Рекомендуемая схема оздоровления при нарушениях жирового обмена и в комплексной программе снижения веса
2. Рекомендуемая схема для повышения защитных сил организма и профилактики простудных заболеваний
3. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ, гриппа.....
4. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы (при повышенном артериальном давлении)
5. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы (при пониженном артериальном давлении).....
6. Рекомендуемая схема для реабилитации после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (постинсультное состояние).....
7. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии варикозной болезни.....
8. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии геморроя
9. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии сахарного диабета
10. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии хронических гастритов, дуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.....
11. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей
12. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии описторхоза
13. Рекомендуемая схема применения продукции в комплексной терапии лямблиоза.....
14. Рекомендуемая схема профилактики и применения в комплексной терапии туберкулеза
15. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии патологии опорно-двигательного аппарата
16. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний периферической нервной системы (невриты, радикулиты).....
17. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы у женщин...
18. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин
19. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии миомы матки.....
20. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии климакса
21. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии заболеваний мочеполовой системы у мужчин
22. Рекомендуемая схема для профилактики и применения в комплексной терапии онкологических заболеваний.....
23. Рекомендуемая схема применения биологически активных веществ к пище для профилактики и в комплексной терапии мастопатии.....
24. Рекомендуемая схема применения биологически активных веществ к пище для профилактики и комплексной терапии доброкачественной терапии.....
25. Рекомендуемая схема применения биологически активных веществ к пище для профилактики и комплексной терапии мастопатии.....
26. Рекомендуемая схема применения биологически активных веществ к пище для профилактики и комплексной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы.....

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЖИРОВОГО ОБМЕНА И В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СНИЖЕНИЯ
ВЕСА**

Общие рекомендации

- В питании ограничить сладости, мучное, то есть углеводсодержащие продукты.
- Ограничить прием пищи после 18 часов.
- Употреблять несладкие фрукты и овощи.
- Исключить острые приправы, ограничить употребление соли.
- Увеличить физические нагрузки (пешие прогулки, плавание и т. д.).

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Ширлайн	В течение 4 недель 3 раза в неделю**	2 ч.л. растворить в 200 мл воды, 1 раз в день утром натощак
Гепатосол на растительной клетчатке	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Токсидонт-май	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Галега-Нова или Галега-Нова на растительной клетчатке	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 раза в день
Лактавия (черника)	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ШИРЛАЙН (30 г)

2 УПАКОВКИ

ГЕПАТОСОЛ на растительной клетчатке (90 г)

1 УПАКОВКА

ГАЛЕГА-НОВА (90 г) или

ГАЛЕГА-НОВА на растительной клетчатке (90 г)

2 - 3 УПАКОВКИ

ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)

4 – 6 УПАКОВОК

ЛАКТАВИЯ черника (100 г)

3 – 4 ФЛАКОНА

Возможна вариация дозировок и длительности приема по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Общие рекомендации

- По возможности совершать прогулки на свежем воздухе, на лыжах.
- Избегать контакта с больными гриппом и ОРВИ.
- Принимать контрастный душ.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
Тонизид	4 недели**	По 1 ч.л. утром до еды
*Флорента	4 недели	Развести водой в 5–10 раз, по 1 ст. л. 3 раза в день внутрь; по 1–2 капли в каждый носовой ход 2 раза в день
Витамикс или Витамикс на растительной клетчатке	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Флорента спрей	в сезон эпидемии гриппа и ОРВИ	Распылять в помещении 2–3 раза в день, обрабатывать полость ротоглотки 2–3 раза в день.

Примечание: * - основные средства.

** - не использовать при гипертонии, аритмии, высокой температуре, бессоннице.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ТОНИЗИД (90 г) 1 УПАКОВКА

ФЛОРЕНТА напиток (200 мл) 1 ФЛАКОН

ФЛОРЕНТА спрей (50 мл) 2 ФЛАКОНА

ВИТАМИКС (120 г) или

ВИТАМИКС на растительной клетчатке (90 г) 2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ОРВИ, ГРИППА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
----------	---------------------	--------------

*Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1 ст. л. 3 раза в день внутрь; по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день;
*Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Экстракт подорожника	2-4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл теплой воды
Эплир масляный – (при насморке)	7-14 дней****	По 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день
*Флорента крем	7-14 дней****	Растирать грудную клетку
*Флорента спрей	7-14 дней	Распылять в помещении 2 – 3 раза в день, обрабатывать полость рото- глотки 2 – 3 раза в день
Эсобел гранулы	7-14 дней****	Растворить 1 ч.л. гранул в 1 ст. теплой воды, полоскать горло 5-6 раз в день, закапывать в нос 3 – 4 раза в день
Тонизид (в период выздоровления)	4 недели**	По 1 ч.л. утром до еды
*Рейши - Кан	3-4 недели***	По 1 ч.л. 2 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** - не использовать при гипертонии, аритмии, высокой температуре, бессоннице.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

**** - длительность применения зависит от выраженности симптомов.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ФЛОРЕНТА напиток (200 мл)	2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА спрей (50 мл)	2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА крем (30 г)	1 – 2 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС (120 г)	2 УПАКОВКИ
РЕЙШИ-КАН (100 г)	1 УПАКОВКА
ЭКС-Т ПОДОРОЖНИКА (75 мл)	2 – 4 ФЛАКОНА
ЭПЛИР 1% масляный р-р (10 мл)	1 ФЛАКОН
ТОНИЗИД (90 г)	1 УПАКОВКА
ЭСОБЕЛ (50 г)	1 УПАКОВКА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
(при повышенном артериальном давлении)**

Общие рекомендации

- Избегать стрессовых ситуаций.
- Дозировать физическую нагрузку, совершать прогулки на свежем воздухе 1–2 часа в день.
- Соблюдать рациональное питание, ограничить прием соли.
- Исключить курение.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Аргозид или Марикад	4 недели, 3–4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 2 капсулы 3 раза в день
*Флавигран- очанка, Флавигран	4–6 недель, 2 раза в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Растворить в 5-10 раз, по 1 ст. л. 3 раза в день внутри
Гепатосол или Гепатосол на растительной клетчатке	4 недели, 3–4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день за 15–30 минут до еды По 1 ч.л. 3 раза в день
Уролизин	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Климатон	8–12 недель, перерыв на 1 месяц, курс повторить	По 1 ч.л. 3 раза в день и на ночь
*Рейши - Кан	3–4 недели***	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * – основные средства.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

АРГОЗИД (120 г) или	2 УПАКОВКИ
МАРИКАД (90 капсул)	2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г) или	
ГЕПАТОСОЛ на растительной клетчатке (90 г)	2 УПАКОВКИ
КЛИМАТОН (90 г)	4-6 УПАКОВОК
УРОЛИЗИН (120 г)	2 УПАКОВКИ
ФЛАВИГРАН или	
ФЛАВИГРАН – ОЧАНКА (120 г)	2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)	2 ФЛАКОНА
РЕЙШИ - КАН (100 г)	1 – 2 УПАКОВКИ

*Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации
Вашего консультанта.*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (при пониженном артериальном
давлении)**

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
Флорента	4 недели	Развести в 5–10 раз, по 1–2 ст.л., 3 раза в день
*Климатон плюс	8–12 недель, перерыв на 1 месяц, курс повторить	По 1 ч.л. 3 раза в день
* Флавигран- очанка или Флавигран- очанка на растительной клетчатке	4–6 недель, 2 раза в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Гепатосол или Гепатосол на растительной клетчатке	4 недели, 3–4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Тонизид	4 недели, 3–4 курса в год**	По 1 ч. л. утром до еды

Примечание: * – основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ГЕПАТОСОЛ (90 г) или
 ГЕПАТОСОЛ на растительной клетчатке (90 г) **2 УПАКОВКИ**
 КЛИМАТОН ПЛЮС (90 г) **4-6 УПАКОВОК**
 ТОНИЗИД (90 г) **1 УПАКОВКА**
 ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА (120 г) или
 ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА на растительной клетчатке (90 г) **2 УПАКОВКИ**
 ФЛОРЕНТА (200 мл) **2 ФЛАКОНА**

*Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации
Вашего консультанта*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(ПОСТИНСУЛЬТНОЕ СОСТОЯНИЕ)**

Общие рекомендации

- Отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение).
- Ежедневно спать днем (1-1,5 часа).
- Гулять на свежем воздухе (не менее 1,5-2 часов в день).
- Питаться предпочтительно растительными продуктами.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Венорм или Марикад	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 2 капсулы 3 раза в день
*Флавигран-очанка или Флавигран	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Аргозид (при повышенном АД)	4 недели**	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Рейши - Кан	3-6 недель***	По 1 ч.л. 2 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
Гепатосол или Семена солянки холмовой	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 3 капсулы 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** - не применять при гипотонии.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

Рекомендуемое количество средств по схеме:	
ГЕПАТОСОЛ (90 г) или	2 УПАКОВКИ
СЕМЕНА СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ (190 капсул)	1 УПАКОВКА
АРГОЗИД (120 г)	2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)	2 ФЛАКОНА
РЕЙШИ - КАН (100 г)	1 – 2 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ (120 г) или	
МАРИКАД (90 капсул)	2 УПАКОВКИ
ФЛАВИГРАН или	
ФЛАВИГРАН - ОЧАНКА (120 г)	2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ**

Общие рекомендации

- Снизить массу тела до оптимального уровня.
- Исключить прием горячих ванн, посещение саун без консультации врача.
- Размещать ноги в приподнятом положении во время сна.
- Носить обувь на каблучке не выше 3 – 4 см.

- Регулярно обливать ноги контрастным душем.
- Носить эластичные колготки.
- Часто изменять положение ног при длительном сидении.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Венорм гранулы или Марикад	4 недели, перерыв на 6 недель, курс повторить	По 1 ч.л. 3 раза в день По 2 капсулы 3 раза в день
*Венорм крем	Одновременно с гранулами Венорма или капсулами Марикада	2 раза в день наносить на пораженный участок
Гепатосол или Семена солянки холмовой	4 недели, курс 2 раза в год	По 1 ч.л. 3 раза в день По 3 капсулы 3 раза в день
*Рейши - Кан	3–6 недель***	По 1 ч.л. 2 раза в день
Флавигран	3–4 недели, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Ширлайн (при наличии запоров)	2 недели**	2 ч.л. растворить в 1 стакане воды, принимать утром натощак 3 раза в неделю

Примечание: * – основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

*** – заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ВЕНОРМ ГРАНУЛЫ (120 г) или	2 УПАКОВКИ
МАРИКАД (90 капсул)	2 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ КРЕМ (50 мл)	3 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)	2 УПАКОВКИ
или СЕМЕНА СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ (190 капсул)	1 УПАКОВКА
ФЛАВИГРАН (120 г)	1 УПАКОВКА
РЕЙШИ - КАН (100 г)	1 – 2 УПАКОВКИ
ШИРЛАЙН (30 г)	2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕМОРРОЯ

Общие рекомендации

- Устранить запоры.
- Нормализовать вес.
- Соблюдать личную гигиену.
- Исключить прием горячих ванн, посещение саун без консультации врача.

	СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
Период обострения	*Токсидонт–май или Семена лопуха	7–10 дней	По 1 ч.л. 2 раза в день (растворить в 100 мл теплой воды) По 3 капсулы 3 раза в день
	*Эплир масляный	7–10 дней	Смазывать воспаленные геморроидальные узлы 2–3 раза в день
	Флорента	Весь период обострения	Гигиеническое обмывания теплым раствором после стула (разведение 1:10)
	*Ахиллан	7–10 дней	По 1 ч.л. 3 раза в день
Период выздоровления	*Венорм или Венорм на растительной клетчатке гранулы	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Венорм крем	2–4 недели	Наносить на геморроидальные узлы 2 раза в день
	Флорента	Весь период обострения	Гигиеническое обмывания теплым раствором после стула (разведение 1:10)
Ремиссия (вне обострения)	*Витамикс	2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Ширлайн с лохенином (при наличии запоров)	2 недели**	2 ч.л. растворить в 1 стакане воды, принимать утром натощак, 3 раза в неделю

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ТОКСИДОНТ – МАЙ (75 мл) или	1 УПАКОВКА
СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул)	1 УПАКОВКА
АХИЛЛАН (90 г)	3 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ ГРАНУЛЫ (120 г) или	1 УПАКОВКА
ВЕНОРМ на растительной клетчатке (90 г)	2 ФЛАКОНА
ВЕНОРМ КРЕМ (50 мл)	1 УПАКОВКА
ЭПЛИР 1% масляный р-р (10 мл)	2 ФЛАКОНА

ФЛОРЕНТА (200 мл)
ШИРЛАЙН С ЛОХЕИНОМ (30 г)
ВИТАМИКС (120 г)

2 ФЛАКОНА
2 УПАКОВКИ
1 УПАКОВКА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Общие рекомендации

- Соблюдать назначения врача и специальную диету (стол № 8).
- Не допускать резких колебаний глюкозы в крови.
- Тщательно ухаживать за кожей, особенно на ногах.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Гепатосол (на сорбите) или Гепатосол на растительной клетчатке	4 недели, 2–3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Лактавия (с черникой или облепихой по вкусу)	Постоянно	Добавлять в чай, кофе, какао, морсы и т.д.
*Галега-Нова	4 недели, 1–3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флавигран	4 недели, 4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Венорм на растительной клетчатке	4 недели, 4 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Венорм крем	4 недели, 4 курса в год	Наносить на стопы 2 раза в день
*Токсидонт-май или Семена лопуха	1 месяц, 2–3 курса в год	По 0,5 ч.л. 2-3 раза в день По 3 капсулы 3 раза в день
Бетулан (ванночки для ног)	1–2 раза в неделю, постоянно	40 г соли растворить в 1 л теплой воды, время процедуры 20-25 минут
*Рейши - Кан	3–6 недель, 1–2 курса в год	По 1 ч.л. 2 раза в день
Флорента напиток	4 недели, 4 курса в год	Развести в 5 -10раз, по 1 ст.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ГЕПАТОСОЛ (90 г) или

ГЕПАТОСОЛ на растительной клетчатке (90 г) 2 УПАКОВКИ

ГАЛЕГА-НОВА (90 г) 2–6 УПАКОВОК

ФЛАВИГРАН (120 г) 2 УПАКОВКИ

ВЕНОРМ на растительной клетчатке (90 г) 2 УПАКОВКИ

ВЕНОРМ КРЕМ (50 мл) 2 УПАКОВКИ

ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл) или 1 ФЛАКОН

СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул) 1 УПАКОВКА

ФЛОРЕНТА (200 мл) 2 ФЛАКОНА

РЕЙШИ - КАН (100 г) 1–2 УПАКОВКИ

ЛАКТАВИИ (100 г) на 1 месяц 4 ФЛАКОНА

БЕТУЛАН (40 г) на 1 месяц 8 УПАКОВОК

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ, ДУОДЕНИТА, ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**

Общие рекомендации

- Исключить курение.
- Ограничить применение алкогольных напитков.
- Питаться часто, дробно, до 6 раз в сутки.
- Пунктуально выполнять рекомендации по оздоровлению желудочно-кишечного тракта.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Ахиллан гранулы или Ахиллан на растительной клетчатке	4–6 недель, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Гепатосол гранулы	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
*Токсидонт-май или Семена лопуха	4–6 недель, 2 курса в год	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды. По 3 капсулы 3 раза в день
Ширлайн**	10–15 дней	1 ч.л. растворить в 200 мл воды, принимать по 70 мл 3 раза в день
Экстракт подорожника***	4–6 недель, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Лактавия*** (черника)	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

*** – при гастритах с пониженной кислотностью.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

АХИЛЛАН при гастритах: (90 г)	2 УПАКОВКИ
при язвенной болезни: (90 г) или	3 УПАКОВКИ
АХИЛЛАН на растительной клетчатке (90)	2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)	2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)	2 ФЛАКОНА
ШИРЛАЙН (30 г)	1 УПАКОВКА
ТОКСИДОНТ–МАЙ (75 мл) или	2 ФЛАКОНА
СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул)	1 УПАКОВКА
ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА (75 МЛ)	4–6 ФЛАКОНОВ
ЛАКТАВИЯ (черника) (75 мл)	3–4 ФЛАКОНА

Возможна вариация дозировок и длительности приема по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Общие рекомендации

- Соблюдение диеты (ограничение жирного, острого, жареного, мучного, алкогольных напитков).
- Питаться часто, дробно, до 6 раз в сутки.
- Пунктуально выполнять рекомендации по оздоровлению желудочно-кишечного тракта.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Гепатосол или *Липроксол	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Токсидонт-май или Семена лопуха	4 недели 3 недели	По 0,5 ч. л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды По 3 капсулы 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5 – 10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
Витамикс на растительной клетчатке	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Уролизин (при ЖКБ)	4 недели, 3 курса в год (при величине камней не более 5 мм)	По 1 ч.л. 4 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ГЕПАТОСОЛ или ЛИПРОКСОЛ (90 г)	2 УПАКОВКИ
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл) или	2 ФЛАКОНА
СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул)	1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА (200 мл)	2 ФЛАКОНА
ВИТАМИКС на растительной клетчатке (90 г)	2 УПАКОВКИ
УРОЛИЗИН (120 г)	2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОПИСТОРХОЗА

Общие рекомендации

- Соблюдать правильную технику разделки рыбы.
- Выдерживать правила термической обработки рыбы.
- Не пробовать сырую рыбу и рыбный фарш на соленость и готовность.
- Выбирать надежный способ соленья рыбы.
- Не давать сырую рыбу домашним животным.

ЭТАП	СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
1. Подготовительный	*Гепатосол	2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Ахиллан	2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	Флорента	2 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
2. Воздействие на паразита	*Экорсол или Популин	1 неделя	По 3 ч.л. 3 раза в день взрослым; детям 3-6 лет - 1/3 дозы, 6 - 12 лет -2/3 дозы взрослого.
	*Гепатосол	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Токсидонт-май	1 неделя	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
	*Гепатосол	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Ахиллан	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
3. Восстановительный	*Ширлайн	2 недели**	Тюбажи 1-2 раза в неделю
	Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
	Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при желчекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, подозрении на новообразование.

***Рекомендуется на 3 этапе в схему включить энтеросорбент (4-5 дней). Контроль эффективности через 6 месяцев после окончания схемы: 3-хкратно кал на яйца описторхисов, дуоденальное зондирование.

Обязательна консультация с лечащим врачом (в т.ч. при наличии желчекаменной болезни).

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ГЕПАТОСОЛ (90 г)	3 УПАКОВКИ
АХИЛЛАН (90 г)	2 УПАКОВКИ
ШИРЛАЙН (30 г)	1 УПАКОВКА
ЭКОРСОЛ (42 г) или	3 УПАКОВКИ (для взрослых)
ПОПУЛИН (200 мл)	1 ФЛАКОН
ТОКСИДОНТ - МАЙ (75 мл)	1 ФЛАКОН
ВИТАМИКС (120 г)	2 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (200 мл)	2 ФЛАКОНА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЛЯМБЛИОЗА

Общие рекомендации

- Соблюдать диету: исключить сладкое, выпечку, колбасные изделия, консервы, пряности. Употреблять кисломолочные продукты, отварное мясо, свежие овощи.
- Соблюдать режим рационального питания.

ЭТАП	СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
1. Подготовительный	*Ахиллан	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Гепатосол гранулы	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
2. Воздействие на паразита	*Танаксол плюс	1 неделя	Детям с 12 лет и взрослым по 1 ч.л. 3 раза в день, взрослым с массой тела > 70 кг по 2 ч.л. 3 раза в день. детям возрастные дозировки см. в инструкции
	*Токсидонт-май	1 неделя	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
3. **Восстановительный	*Ахиллан	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Гепатосол гранулы	3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Ширлайн	2 недели	Тюбажи 1-2 раза в неделю
	Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
	Витамикс гранулы или Витамикс на растительной клетчатке	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

При тяжелой степени инвазии танаксол необходимо сочетать с синтетическими противоязными препаратами.

***На 3 этапе в схему включить энтеросорбент в течение 4-5 дней вечером на ночь через 2 часа после еды.*

Контрольные анализы провести через 1 месяц после окончания курса (3-хкратно кал на яйца простейших).

При наличии желчекаменной болезни обязательна консультация с лечащим врачом. Рекомендуется применять продукцию на сорбите. При необходимости, по согласованию с врачом возможно проведение 2 – 3 повторных курсов приема Танаксол плюс с интервалом в 3–5 дней, а также пролонгированных курсов до 14–21 дня непрерывного приема средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

АХИЛЛАН (90 г)	2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)	1 УПАКОВКА
ТАНАКСОЛ плюс (42 г)	1 УПАКОВКА
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)	1 ФЛАКОН
ШИРЛАЙН (30 г)	1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА (50 мл)	6 ФЛАКОНОВ
или (200 мл)	2 ФЛАКОНА
ВИТАМИКС (120 г) ИЛИ	2 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС на растительной клетчатке (90 Г)	3 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (на фоне медикаментозной терапии)

Общие рекомендации

- Использовать специальные схемы питания для больных туберкулезом.
- Не переохлаждаться.
- Исключить алкоголь и курение.
- Ежедневно гулять на свежем воздухе, желательно в хвойном бору.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Популин	4–12 недель	Взрослым по 1 чайной ложке (детям 4-7 лет -1/3, 7-12 лет- 2/3 от дозы взрослого) 3 раза в день
*Гепатосол	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Флорента	4 недели	Развести в 5–10 раз, по 1–2 ст.л. 3 раза в день
*Флорента спрей	постоянно	Распылять в помещении 2–4 раза в день
Токсидонт-май	2–4 недели	По 0,5 ч.л. 3 раза в день (растворив в 100 мл воды)
Рейши - Кан	4–6 недель 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ПОПУЛИН (75 мл)	4–12 ФЛАКОНОВ	
или ПОПУЛИН (200 мл)	2–6 ФЛАКОНОВ	
ГЕПАТОСОЛ (90 г)	2 УПАКОВКИ	
ТОКСИДОНТ-МАЙ (75 мл)	1–2 ФЛАКОНА	
ФЛОРЕНТА (200 мл)		2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА спрей (50 мл)	6 ФЛАКОНОВ	
РЕЙШИ-КАН (100 г)		1–2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Общие рекомендации

- Исключить большие физические нагрузки.
- Снизить массу тела до оптимального уровня.
- Исключить острые приправы и ограничить потребление соли.
- Включить в рацион больше свежих фруктов и овощей.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Эсобел гранулы	3–4 недели	Наружно в виде ванночек, примочек, компрессов 1–2 раза в день
*Крем серии «Эсобел» (на выбор)	3–4 недели	Растирать пораженную область 1–2 раза в день
*Эсобел с экстрактом сабельника или Кальций-Биолит	3–4 недели 4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день во время еды По 2 капсулы 3 раза в день
Флорента крем	3–4 недели	Растереть пораженную область, сухое тепло на ночь
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
Витамикс или Витамикс на растительной клетчатке	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Экорсол	2–3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Скипидарные ванны	2 курса в год	Смешанные, 10 – 15 процедур, с интервалом в 2 дня

Примечание: * - основные средства.

Кремы с эсобелом используются на выбор.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА (120 г) или	1–2 УПАКОВКИ
КАЛЬЦИЙ-БИОЛИТ (90 капсул)	2 УПАКОВКИ
КРЕМ серии ЭСОБЕЛ (50 мл)	1 УПАКОВКА
ЭСОБЕЛ ГРАНУЛЫ (50 г)	1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА КРЕМ (30 мл)	1 УПАКОВКА
ФЛОРЕНТА (200мл)	2 ФЛАКОНА
ЭКОРСОЛ (42 г)	2–3 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС (120 г) или	
ВИТАМИКС на растительной клетчатке (90 г)	2 УПАКОВКИ
СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ № 1 и № 2	по 1 ФЛАКОНУ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (НЕВРИТЫ,
РАДИКУЛИТЫ)**

Общие рекомендации

- Избегать физических нагрузок и переохлаждения.
- Уменьшить количество потребляемой соли.
- Активно заниматься лечебной гимнастикой.
- Использовать в питании больше свежих овощей и фруктов.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Эсобел гранулы	8–10 процедур	Электрофорез (или в сочетании с инфракрасным излучением)
Флорента крем или Крем Эсобел с сабельником	2–3 недели	2–3 раза в день на пораженную область
Скипидарные ванны (в восстановительный период)	12–15 процедур	Смешанные ванны, принимать через 2 дня на третий
Флавигран	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Эсобел с экстрактом сабельника болотного на растительной клетчатке или Эсобел-Арт	3–4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день во время еды По 2 капсулы 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:	
ФЛАВИГРАН (120 г)	2 УПАКОВКИ
ЭСОБЕЛ ГРАНУЛЫ (50 г)	1 УПАКОВКА
КРЕМ ФЛОРЕНТА (30 мл)	2 УПАКОВКИ
или ЭСОБЕЛ КРЕМ (50 мл)	2 УПАКОВКИ
СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ № 1 и № 2	по 1 ФЛАКОН
ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА на растительной клетчатке (90 г)	
или ЭСОБЕЛ-АРТ (90 капсул)	2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН

Общие рекомендации

- Соблюдать правила личной гигиены.
- Не переохлаждаться.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу во избежание осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Уролизин	4–6 недель	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Простадонт или Эсобел с экстрактом сабельника	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5–10 раз, по 1 – 2 ст.л. 3 раза в день
*Токсидонт - май	3–4 недели	По 0,5 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
Экорсол	1–2 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Эсобел гранулы	1%–3% раствор	Электрофорез на 10-14 день от начала терапии
Скипидарные ванны	10–15 процедур	Смешанные, на 10-14 день от начала лечения

Примечание: * – основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ТОКСИДОНТ – МАЙ (75 мл)	2-3 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА (200 мл)	2 ФЛАКОНА
УРОЛИЗИН (120 г)	2 УПАКОВКИ
ПРОСТАДОНТ (90 г) или	2 УПАКОВКИ
ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА (120 г)	2 УПАКОВКИ
ЭКОРСОЛ (42 г)	1–2 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС (120 г)	2 УПАКОВКИ
ЭСОБЕЛ ГРАНУЛЫ (50 г)	1 УПАКОВКА
СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ (250 мл) № 1 и № 2	по 1 ФЛАКОНУ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН**

Общие рекомендации

- Наблюдаться в период обострения у гинеколога.
- Не переохлаждаться.
- Соблюдать правила личной гигиены.

	СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
Острый период	*Эсобел с экстрактом сабельника	1–4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Популин	1 неделя	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Простадонг	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	Флорента	6–8 недель	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
Период выздоровления	Эплир гель	10–12 процедур	Физиолечение ультразвуком, интравагинально
	*Гепатосол	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	*Витасел	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
	Скипидарные ванны (на 10 – 14 день)	8–10 смешанных	Принимать через день, обязательно контроль АД

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ПРОСТАДОНГ (90 г)

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА (120 г)

ПОПУЛИН (75 мл)

ГЕПАТОСОЛ (90 г)

ВИТАСЕЛ (90 г)

ЭПЛИР гель (20 мл)

ФЛОРЕНТА (50 мл)

или (200 мл)

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ (250 мл) № 1 и № 2

2 УПАКОВКИ

1- 2 УПАКОВКИ

2 ФЛАКОНА

2 УПАКОВКИ

2 УПАКОВКИ

2 УПАКОВКИ

6 ФЛАКОНОВ

2 ФЛАКОНА

по 1 ФЛАКОНУ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ

Общие рекомендации

- Придерживаться базового лечения у гинеколога.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Токсидонт–май или Семена лопуха	6–8 недель, 3 курса в год	По 0,5–1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды По 3 капсулы 3 раза в день
Витасел	4 недели, 1–2 курса год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст. л. 3 раза в день
Ахиллан или Ахиллан на растительной клетчатке (при наличии обильных менструаций)	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день По 1 г 3 раза в день
*Гепатосол	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ТОКСИДОНТ - МАЙ (75 мл) или	8 -12 ФЛАКОНОВ
СЕМЕНА ЛОПУХА (190 КАПСУЛ)	2 - 3 УПАКОВКИ
ФЛОРЕНТА (50 мл)	6 ФЛАКОНОВ
или (200 мл)	2 ФЛАКОНА
ГЕПАТОСОЛ (90 г)	2 УПАКОВКИ
АХИЛЛАН (90 г) или	
АХИЛЛАН на растительной клетчатке (90 г)	2 УПАКОВКИ
ВИТАСЕЛ (90 Г)	2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КЛИМАКСА

Общие рекомендации

- Регулярное наблюдение гинеколога.
- Обследование на остеопороз.
- Контроль за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы крови.
- Контроль веса, поддержка его на оптимальном уровне.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Климатон (при повышенном и нормальном АД) или * Климатон плюс (при пониженном АД)	4–6 недель, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Венорм гранулы или Венорм на растительной клетчатке	4–6 недель, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
Гель Блаженство или гель Эплир	при дискомфортных состояниях в области наружных половых органов	По необходимости
Витасел	4–6 недель, 2 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день
* Гепатосол	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Кальций-Биолит	4–6 недель	По 2 капсулы 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

КЛИМАТОН (90 г)	2-3 УПАКОВКИ
КЛИМАТОН ПЛЮС (90 г)	2-3 УПАКОВКИ
ВИТАСЕЛ (90 г)	2-3 УПАКОВКИ
ВЕНОРМ ГРАНУЛЫ (120 г) или	
ВЕНОРМ на растительной клетчатке (90 г)	2 УПАКОВКИ
КАЛЬЦИЙ-БИОЛИТ (90 капсул)	2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г)	2 УПАКОВКИ
БЛАЖЕНСТВО гель или ЭПЛИР гель	По необходимости

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН (хронический простатит, аденома простаты, бесплодие, заболевания почек, мочевого пузыря)

Общие рекомендации

- Соблюдать правила личной гигиены.
- Не переохлаждаться.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу во избежание осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
*Простадонт	4 недели**	По 1 ч.л. 4 раза в день
*Экорсол или Популин	1–3 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1-2 ст.л. 3 раза в день
*Поликавин (после простадонта)	10 дней**	По 1 ст.л. 1 раз в день
	4–12 недель (при мужском бесплодии)	по 1 ст.л. 1 раз в день
*Уролизин	4 недели**	По 1 ч.л. 3 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** – не применять при наличии крупных конкрементов в почках и мочевом пузыре, желчном пузыре более 0,5 мм.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ПРОСТАДОНТ (90 г)

ЭКОРСОЛ (42 г)

или ПОПУЛИН (75 мл)

УРОЛИЗИН (120 г)

ФЛОРЕНТА (200 мл)

ПОЛИКАВИН (110 г)

3 УПАКОВКИ
1–3 УПАКОВКИ
1–3 ФЛАКОНА
2 УПАКОВКИ
2 ФЛАКОНА
1 УПАКОВКА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ОРВИ, ГРИППА

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
----------	---------------------	--------------

*Флорента	4 недели	Развести в 5-10 раз, по 1 ст. л. 3 раза в день внутрь; по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день;
*Витамикс	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
Экстракт подорожника	2-4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл теплой воды
Эплир масляный – (при насморке)	7-14 дней****	По 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день
*Флорента крем	7-14 дней****	Растирать грудную клетку
*Флорента спрей	7-14 дней	Распылять в помещении 2 – 3 раза в день, обрабатывать полость рото- глотки 2 – 3 раза в день
Эсобел гранулы	7-14 дней****	Растворить 1 ч.л. гранул в 1 ст. теплой воды, полоскать горло 5-6 раз в день, закапывать в нос 3 – 4 раза в день
Тонизид (в период выздоровления)	4 недели**	По 1 ч.л. утром до еды
*Рейши - Кан	3-4 недели***	По 1 ч.л. 2 раза в день

Примечание: * - основные средства.

** - не использовать при гипертонии, аритмии, высокой температуре, бессоннице.

*** - заменяет прием других средств для внутреннего применения в схеме.

**** - длительность применения зависит от выраженности симптомов.

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ФЛОРЕНТА напиток (200 мл)	2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА спрей (50 мл)	2 ФЛАКОНА
ФЛОРЕНТА крем (30 г)	1 – 2 УПАКОВКИ
ВИТАМИКС (120 г)	2 УПАКОВКИ
РЕЙШИ-КАН (100 г)	1 УПАКОВКА
ЭКС-Т ПОДОРОЖНИКА (75 мл)	2 – 4 ФЛАКОНА
ЭПЛИР 1% масляный р-р (10 мл)	1 ФЛАКОН
ТОНИЗИД (90 г)	1 УПАКОВКА
ЭСОБЕЛ (50 г)	1 УПАКОВКА

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МАСТОПАТИИ

Общие рекомендации

- Своевременно проходить маммологическое обследование.
- Избегать переохлаждения.
- Избегать избыточной инсоляции.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Средство	Длительность приема	Схема приема
* Семена лопуха	4 недели, 3 курса в год	По 3 капсулы 3 раза в день
*Токсидонт-май	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
*Мамавит гель	4 недели, 3 курса в год	Местно, на область молочных желез, 2

		раза в день
*Венорм гранулы	4 недели, 3 курса в год	По 1 ч.л. 3 раза в день

*Примечание: * - основные средства*

Все рекомендуемые БАД применяются одновременно!

Рекомендуемое количество средств по схеме:

СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул) 2 УПАКОВКИ
ТОКСИДОНТ - МАЙ (75 мл) 4 ФЛАКОНА
ВЕНОРМ (90 г) 2 УПАКОВКИ
МАМАВИТ гель (50 мл) 2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и длительности приема по рекомендации Вашего консультанта.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Общие рекомендации

- Соблюдать правила личной гигиены.
- Избегать переохлаждения.
- При первых признаках заболевания обращаться к врачу во избежание осложнений и перехода болезни в хроническую форму.

СРЕДСТВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА	СХЕМА ПРИЕМА
* Семена лопуха (капсулы)	4 недели	По 3 капсулы 3 раза в день
*Токсидонт-май	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день, растворив в 100 мл воды
*Гепатосол гранулы	4 недели	По 1 ч.л. 3 раза в день
*Простадонт гранулы	4 недели	По 1 ст.л. 1 раз в день
*Уролизин		

*Примечание: * - основные средства.*

Рекомендуемое количество средств по схеме:

ПРОСТАДОНОТ (90 г) 3 УПАКОВКИ
УРОЛИЗИН (120 г) 2 УПАКОВКИ
СЕМЕНА ЛОПУХА (190 капсул) 2 УПАКОВКИ
ГЕПАТОСОЛ (90 г) 2 УПАКОВКИ

Возможна вариация дозировок и средств по рекомендации Вашего консультанта.